



### AANDACHTSPUNTEN BEHEER EN AANLEG VOGELAKKERS

Het is weer tijd voor het inzaaien van braakstroken van de vogelakkers. De vogelakkers zijn primair bedoeld voor broedvogels. Het beheer van de vogelakkers inclusief alle bewerkingen moeten **volledig** in het teken staan van stimuleren en sparen van deze vogelsoorten.

Daarom hieronder een aantal aandachtspunten bij de aanleg en het beheer van de vogelakker.

**De Beheereisen** (voorwaarden waarop door NVWA wordt gecontroleerd) zijn aangepast in de nieuwste versie van het beheerpakket. De NVWA controleert vanaf 2018 niet meer of de vogelakker beweid wordt. Beweiding kan een mooie aanvulling op het beheer zijn (i.p.v. klepelen) maar mag dus niet plaatsvinden in het broedseizoen. De eis van beweiding/geen beweiding staat nu in de aanvullende beheervoorschriften en zal dus door het collectief gecontroleerd worden.

**Beweiding is alleen zinvol als het de boerenlandvogels niet verstoord en hun leefgebied in stand houdt.** We hebben dit jaar een aantal voorbeelden gezien van beweiding op een vogelakker hoe het beslist niet moet. Daarom zijn met ingang van mei 2019 de volgende aanvullende beheervoorschriften wat betreft beweiding van de vogelakker van kracht:

- Beweiding is toegestaan van 1 november tot 1 april met maximaal 8 schapen per ha. Dit is inclusief de lammeren, lammeren tellen dus volwaardig mee.
- Beweiding met andere landbouwhuisdieren is niet toegestaan.

De vogelakker mag dus in een bepaalde periode beweid worden, onder strikte voorwaarden. Het collectief zal hierop toezien.



Zorg ervoor dat een **gewas op de vogelakker staat op 1 juni**. Zaai dus op tijd in zodat er ook duidelijk een gewas staat. Bewaar voor de zekerheid de labels van het zaaizaad of de factuur van het zaaizaad dat gebruikt is.

Het is van **levensbelang voor de boerenlandvogels** dat u voor u de eiwitstroken in de vogelakker gaat maaien overlegt met uw teller. Hij/zij weet de situatie op uw percelen en in samenspraak met hem of haar kunnen nesten en jongen beschermd worden.



### **Aanvullende criteria van Agrarisch Collectief Waadrâne:**

Agrarisch Collectief Waadrâne heeft voor pakket vogelakker een aantal aanvullende criteria opgesteld om een maximaal ecologisch effect te kunnen halen.

Criteria voor de in te zaaien zaadmengsels:

- langdurige aanwezigheid van bloeiende planten
- veelzijdige samenstelling
- structuurverschillen (hoog, laag, dicht, open)
- minimale bewerking (begunstigt voortplanting)

Criteria vogelakker

- 1 Maximaal 60% eiwitgewas en 40% braak, braak inzaaien met gevarieerd zaaimengsel (zie criteria hierboven).
- 2 Eiwitgewas en braak worden in stroken naast elkaar gelegd en ook strooksgewijs beheerd.
- 3 Mengsel voor de braakstroken wordt door collectief samengesteld. Zaaidichtheid wordt door Collectief bepaald.
- 4 Uitrijden van rundveemest mag niet gebeuren met sleepslang.

Aanvullende werkwijze

- 1 Voor het maaien van het eiwitgewas wordt door beheerder contact opgenomen met het Collectief, een medewerker van het Collectief controleert op aanwezigheid van doelsoorten. De medewerker van het Collectief overlegt met beheerder het verloop van het maairegime.

Een aantal criteria zullen we nog even nader toelichten.

Criteria 1 de verhouding 60% eiwitgewas en 40% braak is gekozen omdat uit proeven uitgevoerd door Werkgroep Grauwe Kiekendief, deze verhouding het meest gunstig bleek voor de doelsoort Veldleeuwerik. Zie ook de meegestuurde factsheet vogelakker van de vogelbescherming.

Criteria 3: het collectief schrijft geen zaaimengsel voor, voor de braakstroken. Wel dienen de ingezaaide zaadmengsels te voldoen aan de criteria voor de in te zaaien zaadmengsels. Hiervoor is gekozen omdat er op deze wijze meer variatie komt in de braakstroken en we door middel van lerend beheren van elkaar kunnen leren wat het beste resultaat geeft.





AGRARISCH COLLECTIEF  
WAADRANE

# NIEUWSBRIEF

Mei 2019

3/3

Open Akkerland

## Gewasbescherming is niet toegestaan.

Dit houdt dus ook in dat er voor het inzaaien van een vogelakker geen glyfosaat (round up, panic free) mag worden gebruikt voor onkruidbestrijding. Ook na afloop van de meerjarige vogelakker mag deze niet worden doodgespoten met glyfosaat. Wil men dit wel doen wacht daar dan mee tot na 31 december, het beheerjaar loopt immers van 1 januari tot 31 december.

Bij calamiteiten (distels) mag wel (pleksgewijs) worden ingegrepen, hiervoor een protocol voorhanden dat ingevuld dient te worden. Neem hiervoor contact op met uw gebiedscoördinator. Wees hier erg terughoudend mee en gebruik geen cocktails en/of insecticiden.

## Inzaaien:

Maak voor het inzaaien een aantal keer een vals zaaibed om onkruiddruk in een vroeg stadium al tegen te gaan. Zaai onder goede omstandigheden en rol het zaad eventueel aan. Omdat men verschillende soorten zaad gebruikt bestaat de kans dat er ontmenging plaatsvindt. Controleer dit tijdens het zaaien. Gebruik de voorgeschreven hoeveelheid zaaizaad maar zeker niet meer. Dit in verband met de dichtheid van het latere gewas. Hoe opener het gewas hoe makkelijker het is voor vogels om in te broeden.



Voor een maximaal ecologisch effect legt men bij voorkeur een **braakstrook langs de sloot**. Zodat er een natuurlijke overgang is van het perceel naar de sloot. Van deze overgang kunnen allerlei insecten, amfibieën, eendensoorten en kleine zangvogels profiteren, om te foerageren, te broeden en voort te planten.

**Klepel de slootkanten niet in het broedseizoen.** Het lijkt dan misschien wel netjes, maar bij klepelen wordt veel schade toegebracht, niet alleen aan nesten en jonge vogels maar ook aan het insectenleven. Verder is er in de geklepelde slootkant geen enkele beschutting meer.

Voor vragen tijdens het seizoen kunt u altijd mailen met [collectiefwaadrane@hotmail.com](mailto:collectiefwaadrane@hotmail.com)

Veel succes met het beheer.

